

Информированное согласие на введение препарата Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine

Я, _____
(фамилия, имя, отчество пациента)

_____ года рождения,
проживающий(ая) по адресу: _____

контактный телефон: _____

даю свое согласие на проведение процедуры введения препарата Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine в косметических целях
врачом _____
(фамилия, имя, отчество врача)

Контактный телефон врача: _____

Я подтверждаю, что меня проинформировали о ходе процедуры и о применяемом препарате:

Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine (с лидокаином) представляет собой стерильный апирогенный физиологический гель поперечно сшитой гиалуроновой кислоты неживотного происхождения.

- Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine (с лидокаином) является инъекционным имплантатом в форме геля, предназначенным для пластики глубоких провисаний кожи лица, возникающих, в частности, при ее преждевременном старении.
- Применение препарата Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine (с лидокаином) показано также для контурной и объемной пластики лица с целью коррекции таких его структурных дефектов, как асимметрия, деформация контура или потеря объема губ, щек, подбородка и др.
- Препарат Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine (с лидокаином) применяется путем его инъекционного введения, выполняемого врачом, в глубокие слои дермы, а также в слизистую оболочку губ.
- Включение в препарат лидокаина предназначено для уменьшения болезненных ощущений у пациента во время процедуры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Я ознакомлен(а) со списком противопоказаний для введения препарата Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine (с лидокаином):

- Не допускается введение препарата Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine (с лидокаином) в кожу вокруг глазниц (веки, участки кожи под глазами, «гусиные лапки») и над переносицей.
- Не допускается введение препарата в кровеносные сосуды (внутрисосудистое попадание препарата).
- Не прибегать к массивной коррекции лица.
- Не допускается применение препарата Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine (с лидокаином):
 - у пациентов, страдающих эпилепсией, не контролируемой лечением;
 - у пациентов со склонностью к развитию гипертрофированных рубцов;
 - у пациентов с известной повышенной чувствительностью к гиалуроновой кислоте;
 - у пациентов с известной повышенной чувствительностью к лидокаину или местным анестетикам из группы амидных препаратов;
 - у пациентов, страдающих порфирией;
 - у беременных и кормящих грудью женщин;
 - у детей.

• Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine (с лидокаином) не должен вводиться в участки кожи с признаками воспаления и/или инфицирования (акне, герпес и т.д.).

• Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine (с лидокаином) не должен использоваться одновременно с проведением лазерной терапии, глубокого химического пилинга или процедур дермабразии кожи лица. Введение препарата не рекомендуется в случае возникновения выраженного воспаления кожи после проведения ее поверхностного отшелушивания.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Я предупрежден(а) о возможности возникновения побочных реакций, связанных с введением данного инъекционного имплантата и способных развиваться немедленно или спустя некоторое время. Побочные эффекты включают (приведенный список не является исчерпывающим):

- Возможное развитие после инъекции препарата различных видов воспалительной реакции кожи (покраснение, отек, эритема и др.), которые могут сопровождаться зудом, а также болезненностью при надавливании. Подобные реакции могут сохраняться в течение одной недели. Отеки и кровоизлияния, возникающие при введении препарата в слизистую оболочку, могут носить более выраженный характер, что связано с физиологическими особенностями этих тканей. При этом рекомендуется проведение профилактического противовоспалительного лечения.
- Возникновение кровоподтеков.
- Возникновение уплотнений или узелков на месте инъекции.
- Окрашивание или обесцвечивание тканей в месте введения препарата.
- Недостаточная эффективность процедуры или слабо выраженный эффект заполнения/объемной коррекции.
- Учитывая имеющиеся сообщения о случаях возникновения некроза кожи над переносицей, абсцессов, гранулем и аллергических реакций немедленного или замедленного типа после инъекции гиалуроновой кислоты и/или лидокаина, необходимо учитывать возможный риск развития таких побочных эффектов.

Врач предупредил меня, что при возникновении других, не перечисленных выше явлений или при длительности воспалительной реакции свыше 7 дней, мне следует немедленно сообщить об этом своему лечащему врачу.

Я подтверждаю, что мой лечащий врач:

- Проинформировал меня о ходе процедуры и о применяемом препарате для принятия мною обдуманного решения.
- Дал мне возможность задать до начала процедуры интересующие меня вопросы и получить исчерпывающую информацию.
- Дал мне время обсудить протокол процедуры.
- Получил от меня максимально полную информацию о состоянии моего здоровья и принимаемых мной медикаментах. Я обязуюсь соблюдать все рекомендации моего


лечащего врача до и после процедуры такие, как:

- Не использовать макияж в течение 12 часов после введения препарата.
- Избегать продолжительного пребывания на солнце, воздействия ультрафиолетовых лучей и температур ниже 0°C.
- Не посещать сауну или баню в течение 2-х недель после процедуры.
- Избегать массажа места введения препарата и/или надавливания на него в течение нескольких дней после инъекции.

Я понимаю, что некоторые из возможных осложнений потребуют лечения в течение нескольких месяцев до полного их исчезновения.

Таким образом, я даю свое согласие на проведение данной процедуры моим лечащим врачом.

Я согласен(на) на проведение фото- и видеосъемки процедуры и разрешаю врачу использовать мои фото- и видеоматериалы до и после лечения в научных целях.



Номер серии Juvederm® VOLIFT™ with Lidocaine: _____

Дата процедуры: _____

Примечания: _____

Ф.И.О. пациента: _____ " " _____ 20__ г.

Подпись пациента:

Ф.И.О. врача: _____ " " _____ 20__ г.

Подпись врача: