

**СОСТАВ:**

- Гиалуроновая кислота с перекрестными связями (бутандиол-диглицидил-эфир) 12,5 мг
- Фосфатный буфер, показатель pH 7,2 и сорбитол в достаточном количестве для 1 г
- Наполненный шприц 1 мл

**ОПИСАНИЕ**

Stylage® HydroMax – это гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями, неживотного происхождения, содержащий увлажняющий агент (сорбитол), стерильный, алергогенный, с физиологическим pH и осмолярностью. Упакован в предварительно заполненный шприц 1 мл шприц и стерильным нагреванием в автолаве. Stylage® HydroMax – продукт для одноразового применения. Каждый коробка содержит 1 шприц Stylage® HydroMax объемом 1 мл, 2 стерильных одноразовых иглы, инструкцию, этикетки с номером партии, схема для пациента, другая должна быть приложена к амбулаторной карте пациента.

**ПОКАЗАНИЯ**

Stylage® HydroMax – это гель для инъекций, показанный для улучшения увлажнения и эластичности кожи путем инъекций в средние и глубокие слои дермы лица, шеи, зоны декольте и тыльных сторон рук.

**ДЕЙСТВИЕ**

Stylage® HydroMax должен быть введен путем нескольких инъекций в средние и глубокие слои дермы, что приведет к увеличению увлажненности кожи и ее эластичности. Stylage® HydroMax затем будет медленно рассасываться. В зависимости от типологии кожи пациента и глубины инъекции, необходимо от одного до трех сеансов для оптимального лечения кожи. Регулярные сеансы дополнительной коррекции позволяют поддерживать желаемый длительный эффект коррекции.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Stylage® HydroMax не должен использоваться:

- для инъекций, отличных от внутривенных;
- в комбинации с липингом, лазерными процедурами или дермабразией; практикующий специалист должен определить, как долго необходимо подождать после данных процедур перед инъекциями;
- в кровеносных сосудах (внутрисосудисто);
- у пациентов с непереносимостью фруктозы;
- у пациентов, склонных к развитию гипертрофических рубцов;
- у пациентов, с повышенной чувствительностью к одному из составляющих;
- у беременных женщин или женщин, кормящих грудью, детей;
- на/или рядом с воспаленным или инфицированным участком кожи (ане, герпес...).

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

• Настороженно рекомендуется получить четкое согласие пациента перед лечением.

• Для пациентов, перенесших или страдающих аутоиммунным заболеванием, практикующий специалист должен принять решение о применении препарата в каждом конкретном случае, в зависимости от природы заболевания и соответствующего лечения. Кроме того, он должен удостовериться, что данные пациенты особенно тщательно осмотрены, в частности, им предлагается пройти двойной тест перед процедурой; необходимо отказаться от инъекций, если заболевание прогрессирует.

• Пациенты с предыдущей историей стрептококковой болезни, например, рецидивирующей ангиной или острой систематической ревматитом, должны пройти двойной тест перед каждой инъекцией.

• В случае острого систематического ревматизма с осложнениями на сердце рекомендуется не делать инъекции.

• Избегать приема аспирина, НПВ и тройбоцитарных антиагрегантов, антиагулярирующих средств или витамина С за неделю до инъекций.

• Избегать инъекций имплантантов гаммы Stylage® в области, которые уже корректировались препаратами отличными от препаратов гаммы Stylage®. Клинические данные для таких случаев отсутствуют.

• Не рекомендуется использовать данный препарат в сочетании с другими лекарственными средствами.

• Используйте для инъекций только иглы, поставляемые с Stylage® HydroMax, поскольку их использование в комбинации с данным типом шприцов было проверено.

• Практикующий специалист выбирает длину инъекционной иглы в зависимости от зоны коррекции, типа необходимой коррекции и выбранной техники инъекций.

• Не использовать, если упаковка повреждена (шприц, блистер, оболочка).

• Шприц и любые остатки препарата должны быть утилизированы, иглы утилизируются в надлежащий контейнер в соответствии с государственными нормативами.

• Stylage® HydroMax – имплантант для одноразового применения. Не использовать повторно.

• Препарат должен быть использован только для одного единственного пациента, во избежание перекрестного заражения.

• После вскрытия упаковки препарат ни в коем случае не может быть стерилизован повторно, даже если имплантант не был введен.

**ДОЗИРОВКА – МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ**

Stylage® HydroMax предназначен для инъекции в средние или глубокие слои дермы для биологической регенерации. Процедура проводится практикующим специалистом, имеющим официальную квалификацию и обученным техникам введению инъекционных имплантантов.

• Перед проведением процедуры важно:

- изучить историю болезни пациента;
- объяснить пациенту показания к применению Stylage® HydroMax и ожидаемые результаты;
- объяснить пациенту противопоказания, меры предосторожности, которые необходимо принять, потенциальные побочные эффекты, связанные с лечением, а также дать необходимые советы пациентам.

• Перед инъекцией необходимо:

- дезинфицировать обрабатываемую область соответствующим дезинфицирующим раствором;
- убедиться в том, что иглы не повреждены;
- убедиться в отсутствии помутнения геля.

• Если препарат хранится в холодильнике, то перед инъекцией необходимо нагреть его до комнатной температуры.

• Крепко закрепить иглу на люрексовом наконечнике шприца.

• Следите правилам асептики и мануипулаций, связанным с данным видом процедур.

• Введите препарат в средние/глубокие слои дермы, используя прилагаемую стерильную иглу. Рекомендуется использовать линейно-ретроградную (метод обратного трассирования), точечную технику инъекций или комбинацию этих двух методов. Не введите препарат слишком глубоко, эффективность регенерации будет снижена; в случае слишком поверхностного введения кожа может обесцвечиваться, могут возникнуть легкие узелки, либо коррекция может быть неравномерной.

• Количество вводимого препарата зависит от области лечения и степени дегидратации кожи. Только практикующий специалист может определить необходимую дозу инъекции для оптимального результата.

**СОВЕТЫ ПАЦИЕНТАМ**

• Пациентам рекомендуется щадящим массировать место введения препарата после инъекций, особенно в случае использования пальпаторной техники инъекций.

• Рекомендуется использование крема для загара с высоким коэффициентом защиты в течение двух недель после процедуры.

• Рекомендуется не наносить макияж в течение 12 часов после инъекции и избегать воздействия на обработанную область сильного тепла (ультрафиолет, сауна, турецкие бани) или холода, как минимум, до тех пор, пока не пройдет потенциально возможные постинъекционные отеки и покраснение.

• Практикующий специалист должен проинформировать пациента о необходимости сообщить о любых «аномальных» изменениях в обработанной области (см. побочные эффекты).

**ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

Практикующий врач должен проинформировать пациента о возможных немедленных или отсроченных побочных эффектах, которые могут иметь место после инъекций Stylage® HydroMax. В частности (неисчерпывающий список):

• Воспалительные реакции, такие как: покраснение, отек, эритема, потенциально могут сопровождаться зудом и/или болью в месте введения, которые проходят, в основном, меньше чем через неделю.

Гематомы.

• Уплотнение или узелки, окрашивание или обесцвечивание вокруг места введения.

• Низкий результат или недостаточный эффект наполнения.

• Редкие случаи смертности в гlabеллярной области, абсцессы, гранулемы и гиперчувствительности после введения гиалуроновой кислоты были описаны в литературе. Пациент должен быть проинформирован об этом.

• У пациентов с сильной предрасположенностью к аллергии, дерматологической патологией, нарушением гемостаза или воспалительной патологией, а также при несоблюдении мер предосторожности, повышается риск возникновения немедленных побочных эффектов.

• Пациент должен информировать своего практикующего специалиста о любых побочных эффектах, указанных выше, продолжавшихся более чем одну неделю, или о появлении любых иных немедленных эффектов. Практикующий специалист должен как можно скорее проинформировать об этом дистрибутора или производителя и предпринять соответствующие ситуации действия.

**ХРАНЕНИЕ–СРОК ГОДНОСТИ**

• Stylage® HydroMax должен быть использован до истечения срока хранения, указанного на упаковке и шприце.

• Stylage® HydroMax должен храниться в оригиналной упаковке при температуре от 2°C до 25°C. Избегать замораживания и прямых солнечных лучей.

• Несоблюдение условий хранения может привести к снижению эффективности действия препарата.