

СОСТАВ:

- стабилизированная гиалуроновая кислота 14 мг
- фосфатный буфер, показатель pH 7,2 и маннитол 0,5-1 г
- Наполненный шприц 1 мл

ОПИСАНИЕ

Stylage® Hydro – это гель стабилизированная гиалуроновой кислоты, неживотного происхождения, содержащий антиоксидант (маннитол), стерильный, апирогенный, с физиологическим pH и осмоляльностью. Упаковано в 1 мл шприц и стерилизовано автоклавным нагреванием в автоклаве. Stylage® Hydro – продукт для одноразового применения.

Каждая коробка содержит один шприц Stylage® Hydro объемом 1 мл, 2 стерильных одноразовых иглы, инструкцию, этикетки с номером партии: одна для пациента, другая должна быть приложена доктором к файлу пациента.

ПОКАЗАНИЯ

Stylage® Hydro – это гель для инъекций, показанный для улучшения увлажнения и эластичности кожи, путем использования папулезной техники, серии пунктур или техники наплака в область соединения дермы с эпидермисом в поверхностной дермис лица, шеи, декольте и тыльные стороны рук.

ДЕЙСТВИЕ

Stylage® Hydro должен быть введен путем инъекций в область соединения дермы с эпидермисом или поверхностью дермы лица, используя папулезную технику введения или наплак, что приведет к увеличению увлажненности кожи и ее эластичности. Stylage® Hydro затем будет медленно рассасываться. Следовательно, в зависимости от типологии кожи пациента в зоне лекарства, глубины инъекции, необходимо от одного до трех сеансов для оптимального лечения кожи. Регулярные сеансы дополнительной коррекции позволяют поддерживать желаемый длительный эффект коррекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Stylage® Hydro не должен быть использован:

- Для инъекций, отличных от внутрикожных;
- В комбинации с пилингом, лазерными процедурами или дермабразией; практикующий специалист должен определить, как долго необходимо подождать после данных процедур перед инъекциями;
- В кровеносные сосуды (внутрисосудисто);
- Пациентам, склонным к развитию гиперпротифлактических рубцов;
- Пациентам, имеющим повышенную чувствительность к одному из составляющих;
- Беременным женщинам или женщинам, кормящим грудью, детям;
- В/или рядом с областью кожи, имеющей проблемы воспаления или инфекции (акне, герпес...);

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОННОСТИ

• Настоятельно рекомендуется получить четкое согласие пациента перед лечением.

• Для пациентов с предыдущей историей, а также имеющих аутоиммунное заболевание, практикующий специалист должен принять решение о применении препарата в каждом конкретном случае, в зависимости от природы заболевания и соответствующего лечения. Кроме того, он должен удостовериться, что данные пациенты особенно тщательно осмотрены, в частности, им предлагается пройти двойной тест перед процедурой; и отказаться от инъекций, если заболевание прогрессирует;

• Пациенты с предыдущей историей стрептококковой болезни, такие как повторяющаяся ангиной или острый суставной ревматизм, должны пройти двойной тест перед любой инъекцией. В случае острого суставного ревматизма с осложнениями на сердце, рекомендуется не делать инъекции.

• Избегать приема аспирина, НПВП и тромбоцитарных антиагрегантов, антикоагулянтических средств или витамина С за неделю до инъекций.

• Избегать инъекций имплантатов гаммы Stylage® в области, которые уже корректировались препаратами, отличными от препаратов гаммы Stylage®. Клинические данные для таких случаев отсутствуют.

• Не рекомендуется использовать данный препарат в сочетании с другими лекарственными средствами.

• Используйте для инъекций только иглы, поставляемые с Stylage® Hydro, поскольку их использование в комбинации с данным типом шприцов было проверено.

• Не использовать, если упаковка была нарушена (ширец, блистер, оболочка).

• Шприц и любые остатки продукта должны быть утилизированы в соответствующий контейнер.

• Stylage® Hydro – имплантат для одноразового применения. Не использовать повторно. Препарат должен быть использован только для одного единственного пациента, во избежание перекрестного заражения.

• После вскрытия упаковки, препарат ни в коем случае не может быть стерилизован повторно, даже если имплантат не был введен.

ДОЗИРОВКА – МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Stylage® Hydro предназначен для инъекции в область соединения дермы с эпидермисом или в поверхностную дерму для биологической регенерации. Процедура проводится

практикующим специалистом, имеющим официальную квалификацию, и обученным технике введения инъекционных имплантатов.

• Перед проведением процедуры важно:

– Изучить внимательно историю болезни пациента;

– Объяснить пациенту показания по применению Stylage® Hydro и ожидаемые результаты;

– Объяснить пациенту противопоказания, меры предосторожности, которые необходимо принять, потенциальные побочные эффекты, связанные с лечением, а также дать необходимые советы пациентам.

• Перед инъекцией необходимо:

- дезинфицировать обрабатываемую область соответствующим дезинфицирующим раствором;
- убедиться в том, что иглы не повреждены;
- убедиться в отсутствии помутнения геля.

• Если препарат хранился в холодильнике, то перед инъекцией необходимо нагреть его до комнатной температуры.

• Крепко нажать иглу на лазорвский наконечник шприца.

• Следите правилам асптики и манипуляции, связанных с данным видом процедур.

• Медленно введите препарат в область соединения дермы с эпидермисом или в поверхностную дерму, используя прилагаемую стерильную иглу. Рекомендуется использовать линейно-ретроградную (метод обратного траассирования), мультипунктурную технику инъекций или папулезную технику, или комбинацию этих двух методов. Не вводите препарат слишком глубоко, эффективность регенерации будет снижена; в случае поверхностного введения, кожа может стать обесцвеченной, могут возникнуть легкие узелки, либо коррекция может быть неравномерной.

• Количество вводимого препарата зависит от области лечения и степени дегидратации кожи. Только практикующий специалист может определить необходимую дозу инъекции для оптимального результата.

• Избегайте гиперкоррекции.

• Если игла засорена, не увеличивайте давление, необходимое для инъекции, а замените иглу.

• После инъекции не охлаждайте и хорошо массируйте область введения, чтобы обеспечить однородность коррекции.

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТАМ

• Рекомендуется использовать крема для загара с высоким коэффициентом защиты в течение двух недель после процедуры.

• Рекомендуется использование крема для загара с высоким коэффициентом защиты в течение двух недель после процедуры.

• Рекомендуется не наносить макияж в течение 12 часов после инъекции и избегать действий, на обработанную область сильного тепла (ультрафиолет, сауна, турецкие бани) или холода, как минимум, до тех пор, пока не пройдут потенциально возможные послепищевые отеки и покраснение.

• Практикующий специалист должен проинформировать пациента о том, что он должен сообщить о любом ненормальном развитии обработанной области (см. побочные эффекты).

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Практикующий врач должен проинформировать пациента о возможных, немедленных или поздних побочных эффектах, которые могут пропасть после инъекций Stylage® Hydro. В частности (не исчерывающий список):

• Воспалительные реакции – такие как покраснение, отек, эритема, потенциально могут сопровождаться зудом и/или болью в месте введения, которые проходят, в основном, меньше чем через неделю.

• Гематомы.

• Уплотнение или узелки, окрашивание или обесцвечивание вокруг места введения.

• Низкий результат или недостаточный эффект наполнения.

• Редкие случаи омертвления в гlabеллярной области, абсцесса, гранулемы и гиперчувствительности, после введения гиалуроновой кислоты, были описаны в литературе. Пациент должен быть проинформирован об этом.

• У пациентов с сильной предрасположенностью к аллергии, дерматологической патологией, нарушением гемостаза или воспалительной патологией, а также при несоблюдении мер предосторожности, повышается риск возникновения нежелательных побочных эффектов.

• Пациент должен информировать своего практикующего специалиста о любых побочных эффектах, указанных выше, продолжающихся более чем одну неделю, или о появлении любых иных нежелательных эффектов. Практикующий специалист должен как можно скорее проинформировать об этом дистрибутора или производителя и предпринять соответствующие ситуации действия.

ХРАНЕНИЕ – СРОК ХРАНЕНИЯ

• Stylage® Hydro должен быть использован до истечения срока хранения, указанного на упаковке и шприце.

• Stylage® Hydro должен храниться в оригиналной упаковке при температуре от 2°C до 25°C. Избегать замораживания и прямых солнечных лучей.

• Несоблюдение условий хранения может привести к снижению эффективности действия препарата.