

СОСТАВ:

Гиалуроновая кислота с перекрестными связями (бутандиол-диглицидил-эфир) 26 мг
•Фосфатный буфер, показатель pH 7,2, и маннитол
•Наполненный шприц

1 мл

ОПИСАНИЕ

Stylage® XL – это гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями, неживотного происхождения, содержащий антиоксидант (маннитол), стерильный, алигогенный, с физиологическим pH и осмолярностью. Гель упакован в шприц объемом 1 мл и проптерилизован влажным нагреванием в автоклаве. Stylage® XL – продукт для одноразового применения. Каждая коробка содержит два шприца Stylage® XL, каждый объемом 1 мл, 4 стерильных одноразовых иглы, инструкцию, этикетки с номерами партии: одна для пациента, другая должна быть приложена доктором к файлу пациента.

ПОКАЗАНИЯ

Stylage® XL – это инъецируемый имплантант, предназначенный для инъекций в глубокие слои дермы или подкожии, с целью восстановления или увеличения объема лица (щеки, овал лица, лечение лягушачих глаз), а также для заполнения глубоких морщин. Stylage® XL также показан при лечении липодистрофии лица, в том числе пациентов с ВЧЧ. Stylage® XL также можно применять для омоложения кончики носа путем подкожной инъекции в тыльную часть ладони.

ДЕЙСТВИЕ

Stylage® XL должен быть введен путем инъекций в глубокие слои дермы или подкожии в зоне лечения с целью восстановления или создания объема лица, лечения лягушачих глаз или глубоких морщин. Stylage® XL затем будет медленно рассасываться. Длительность действия препарата зависит от типа кожи пациента и глубины инъекции. Следовательно, в зависимости от типологии кожи пациента в зоне лечения, глубины инъекции, необходим один или два сеанса для оптимального лечения эстетических дефектов. Регулярные сеансы дополнительной коррекции позволяют поддерживать желаемый длительный эффект коррекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Stylage® XL не должен быть использован:
•Для инъекций, отличных от внутрисосудистых или подкожных;
•Для лечения поверхностных морщин;

•В комбинации с пилингом, лазерными процедурами или дермабразией; практикующий специалист должен определить, как долго необходимо подождать после данных процедур перед инъекциями;

•В кровеносных сосудах (внутрисосудисто);
•В периорбитальные и гlabelлярные области, либо в веках;

•Пациентам, склонным к развитию гипертрофических рубцов;

•Пациентам, имеющим повышенную чувствительность к одному из составляющих;

•Беременным женщинам или женщинам, кормящим грудью, детям;

•Всем родам с областью кожи, имеющей проблемы воспаления или инфекции (акне, герпес...).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

•Настороженно рекомендуется получить четкое согласие пациента перед лечением.
•Для пациентов с предыдущей историей, а также имеющих аутоиммунное заболевание, практикующий специалист должен принять решение о применении препарата в каждом конкретном случае, в зависимости от природы заболевания и соответствующего лечения. Кроме того, он должен удостовериться, что данные пациенты особенно тщательно осмотрены, в частности им предлагаются пройти двойной тест перед процедурой; и отказаться от инъекций, если заболевание прогрессирует.

•Пациенты с предыдущей историей стрептококковой болезни, такие как повторяющиеся ангина или острый суставной ревматизм должны пройти двойной тест перед любой инъекцией. В случае острого суставного ревматизма с осложнениями на сердце, рекомендуется не делать инъекций.

•Избегать приема аспирина, НПВП и тромбоцитарных антиагрегантов, антикоагулирующих средств или витамина С за неделю до инъекций.

•Избегать инъекций имплантантов гаммы Stylage® в области, которые уже корректировались препаратами, отличными от препаратов гаммы Stylage®. Клинические данные для таких случаев отсутствуют.

•Не рекомендуется использовать данный препарат в сочетании с другими лекарственными средствами;

•Используйте для инъекций тонкие иглы, поставляемые с Stylage® XL, поскольку их использование в комбинации с данным типом шприца было проверено.

Практикующий специалист выбирает длину инъекционной иглы в зависимости от зоны коррекции, типа необходимой коррекции и выбранной техники инъекций.

•Допускается использование канюль с тупым кончиком (стерильные, с маркировкой CE, с соединительным наконечником конической формы). В этом случае практикующий специалист должен:

•Подобрать размер канюля (диаметр и длина) в зависимости от типа проводимой коррекции;

•Строго соблюдать правила аспирации (в частности во время предварительного прокола кожи);
•Медленно ввести препарат под кожу.

•Не использовать, если упаковка была нарушена (шприц, блистер, оболочка).

•Шприц и любые остатки препарата должны быть утилизированы, иглы и канюли утилизируются в соответствующий контейнер.

•Stylage® XL – имплантант для одноразового применения. Не использовать повторно. Пре-

парят должен быть использован только для одного единственного пациента, во избежание перекрестного заражения.

•После вскрытия упаковки, препарат ни в коем случае не может быть стерилизован повторно, даже если имплантант не был введен.

ДОЗИРОВКА – МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ

Stylage® XL: предназначен для глубоких дермальных или подкожных инъекций, с целью заполнения складок кожи и/или для объемной аугментации лица. Процедура проводится практикующими специалистами, имеющими официальную квалификацию, и обученным техникам введению инъекционных имплантантов.

•Перед проведением процедуры важно:

- Изучить анамнестическую историю болезни пациента;
- Объяснить пациенту показания по применению Stylage® XL, ожидаемые результаты;
- Объяснить пациенту противопоказания, меры предосторожности, которые необходимо принять, потенциальные побочные эффекты, связанные с лечением, а также дать необходимые советы пациентам.

•Перед инъекцией необходимо:

- дезинфицировать обрабатываемую область соответствующим дезинфицирующим раствором;
- убедиться в том, что иглы не повреждены;
- убедиться в отсутствии помутнения геля.

•Если препарат хранится в холодильнике, то перед инъекцией необходимо нагреть его до комнатной температуры.

•Крепко накрутить иглу/канюль на козырьковый наконечник шприца.

•Следите правильная аспирация и манипуляции, связанные с данным видом процедур.

•Медленно введите препарат в глубокий слой дермы или подкожию, используя прилагаемую стерильную иглу/выбранную канюль. Рекомендуется использовать линейно-ретроградную (метод обратного траассирования) или мультипунктурную технику инъекций, или комбинацию этих двух методов. В случае поверхностного введения, кожа может стать обесцвеченной, могут возникнуть легкие узелки, либо коррекция может быть неравномерной.

•Количество вводимого препарата зависит от морщин или дефекта кожи, который необходимо корректировать. Только практикующий специалист может определить необходимую дозу инъекций для оптимального результата.

•Избегайте гиперкоррекции. Не рекомендуется превышать дозу 2,0 мл для одной обрабатываемой зоны за сеанс, а также вводить более 20 мл гиалуроновой кислоты с перекрестными связями одному человеку в течение года.

•Если игла/канюль засорена, не увеличивайте давление, необходимо для инъекции, а замените иглу/канюль.

•После инъекции не сжимайте и хорошо массируйте область введения, чтобы обеспечить однородность коррекции.

СОВЕТЫ ПАЦИЕНТАМ

•Рекомендуется использование крема для загара с высоким коэффициентом защиты в течение двух недель после процедуры.

•Рекомендуется не наносить макияж в течение 12 часов после инъекции и избегать действий на обработанную область сильного тепла (ультрафиолет, сауна, турецкие бани или холода, как минимум, до тех пор, пока не пройдут потенциально возможные послепрекоррекционные отеки и покраснение).

•Практикующий специалист должен проинформировать пациента о том, что он должен сообщить о любом ненормальном развитии обработанной области (см. побочные эффекты).

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Практикующий специалист должен проинформировать пациента о возможных, немедленных или подкожных побочных эффектах, которые могут проявиться после инъекций Stylage® XL. В частности (не исчерпывающий список):

•Физиологические реакции – такие как покраснение, отек, зритма, потенциально могут сопровождаться судорогами и/или болью в месте введения, которые проходят, в основном, меньше чем через неделю.

•Гематомы.

•Утолщения или узелки, охвачивание или обесцвечивание вокруг места введения.

•Низкий результат или недостаточный эффект заполнения.

•Редкие случаи омертвления в гlabelлярной области, абсцессы, гранулемы и гиперчувствительности, после введения гиалуроновой кислоты были описаны в литературе. Пациент должен быть проинформирован об этом.

•У пациентов с сильной предрасположенностью к аллергии, дерматологической патологией, нарушением гемостаза или воспалительной патологией, а также при несоблюдении мер предосторожности, повышается риск возникновения нежелательных побочных эффектов.

•Пациент должен информировать своего практикующего специалиста о любых побочных эффектах, указанных выше, продолжающихся более чем одну неделю, или о появлении любых иных нежелательных эффектов. Практикующий специалист должен как можно скорее проинформировать об этом дистрибутора или производителя и предпринять соответствующие ситуации действия.

ХРАНЕНИЕ– СРОК ГОДНОСТИ

•Stylage® XL должен быть использован до истечения срока хранения, указанного на упаковке и шприце.

•Stylage® XL должен храниться в оригинальной упаковке при температуре от 2°C до 25°C.

Избегать замораживания и прямых солнечных лучей.

•Несоблюдение условий хранения может привести к снижению эффективности действия препарата.