

# Инструкция по применению



## ПДРН 7,5

Гель косметический на основе ПДРН  
(полидезоксирибонуклеотидов) 7,5 мг на 1 мл

3 мл

---

**Описание:** Стерильный косметический гель на основе ПДРН (полидезоксирибонуклеотидов).

Однородный, бесцветный, прозрачный гель в стеклянном флаконе, упакованном в блистер.

**Область применения:** Эстетическая медицина

**Состав:** ПДРН (полидезоксирибонуклеотиды) 7,5 мг на 1 мл, натрия хлорид, натрия гидрофосфат безводный, натрия дигидрофосфата дигидрат, вода для инъекций.

**Значение pH:** 7–7,5

**Курс:** от 3 до 5 процедур

**Поддерживающий курс:** 1–2 процедуры каждые три месяца

---

### Показания:

- Работа в деликатных зонах с тонкой кожей (орбитальная зона, виски, шея, кожа головы)
- Пациенты с истонченной, обезвоженной кожей
- Коррекция возрастных признаков в зоне вокруг глаз: морщины, сухость и истончение кожи, пигментация
- Пациенты с признаками дисплазии соединительной ткани
- Лечение и профилактика себореи и аллопеции кожи головы, устранение выпадения волос
- Поддержка микроциркуляторного русла при куперозе, розацеа
- Улучшение микрорельефа кожи
- Нарушение работы сальных желёз, акне и постакне
- Профилактика пигментации и фотостарения перед сезоном ~~активной инсоляции~~
- Подготовка и восстановление после агрессивных процедур и операций (пилинги, лазерные шлифовки, RF-лифтинг, блефаропластика) – в фазе реабилитации
- Комплексное лечение рубцов и растяжек на ранних стадиях формирования до 6 месяцев (атрофических, нормотрофических) – за счет стимуляции синтеза коллагена

### Противопоказания:

- Беременность и период лактации
- Возраст до 18 лет
- Индивидуальная непереносимость компонентов препарата
- Аутоиммунные заболевания
- Острые инфекционные и воспалительные заболевания

- Повышенная температура тела
- Нарушения свертываемости крови и приём фармацевтических антикоагулянтов
- Тяжелые хронические заболевания
- Дерматозы и воспалительные элементы в острой фазе в зоне проведения процедуры
- Открытые раны и травмы на коже

**Меры предосторожности:** Не использовать препарат, если флакон открыт или поврежден. Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке. Содержимое флакона стерильно, внешняя поверхность флакона не стерильна. Не смешивать с другими препаратами.

**Срок годности:** 24 месяца с даты производства

**Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +5°C до +25°C

**Комплектность:**

- гель во флаконе – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

**Утилизация:**

По окончании срока хранения закрытый либо вскрытый флакон утилизируется как медицинские отходы класса Б, упаковка класса А, в соответствии с СанПин 2.1.7.27.90-10.

#### Символы, используемые в маркировке:



Использовать до



Код партии



Обратитесь к инструкции по применению



Не использовать при повреждении упаковки



Температурный диапазон



Стерилизация паром или сухим теплом  
Стерильная жидкость внутри изделия



Не стерилизовать повторно



Не допускать воздействия солнечного света



Соответствие международному стандарту



Применять по предписанию

**Произведено:** ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ ЭСЭЛ БЬЮТИ», 105082, Москва, Спартаковская площадь, дом 14, строение 3, помещение 4Ц

**Контакты:**  
8 (495) 294-09-09  
[www.favori.pro](http://www.favori.pro)

