



FORMA E PRESENTAZIONE
Soluzione trasparente, incolore, sterile, ottenuta per ripartizione asettica, apogena, iniettabile e monouso, presentata in confezioni da 10 fiasconcini da 5 ml. Ogni confezione contiene un foglio illustrativo e 20 etichette di tracciabilità.

COMPOSIZIONE
VISCODERM® SKINKO E: Acido ialuronico* 2 mg + Antiaging complex** q.s.p 5 ml
VISCODERM® SKINKO E: Acido ialuronico* 32 mg + Antiaging complex** q.b. a 5 ml

*Acido ialuronico non reticolato, di origine biotecnologica.
**Antiaging complex (Ameliorato di conservazione tamponato) contenente: Acqua per preparazione iniettabile, Mollibdato di Ammonio, Metanadato di Ammonio, Cloruro di Calcio, Solfato di Ferro, Cloruro di Potassio, Solfato di Rame, Cloruro di Magnesio, Solfato di Manganese, Acetato di Sodio, Idrogenocarbonato di Sodio, Cloruro di Sodio, Idrogenosolfato di Sodio, Metasilicato di Sodio, Solente di Sodio, Cloruro di Sodio, Solfato di Zinco, Alanina, Arginina, Asparagina, Acido Aspartico, Cisteina, Glutamina, Acido Glutamico, Glicina, Isetidina, Isoleucina, Leucina, Metionina, Fenilalanina, Prolina, Serina, Treonina, Triptofano, Tirosina, Valina, Adenina, Biotina, Pantotato di Calcio, Cloruro di Calcio, Acido Folico, Inositolo, Nicotinamide, Piridossina, Riboflavina, Tiamina, Cianocobalamina, Desossitimidina, Glucosio, Puteosina, Piruvato di Sodio, Acido Lipico. Nessuno dei componenti è di origine animale o umana.

USO PREVISTO

Materiale di sostituzione della matrice extracellulare, a base di acido ialuronico. Si tratta di un impianto riassorbibile destinato ad essere iniettato, mediante tecniche di microiniezioni, nel derma sottostante e medio per colmare la perdita di matrice extracellulare e per idratare la pelle a seguito degli effetti dell' invecchiamento.

INDICAZIONI
I dispositivi VISCODERM® SKINKO E a VISCODERM® SKINKO E sono indicati per il derma superficiale e medio del viso (rughe periorbitali, periorali, nasolabiali e nasolabiali), nel derma sottostante e medio per colmare la perdita di matrice extracellulare e per idratare la pelle a seguito degli effetti dell' invecchiamento dovuti all'età, allo stile di vita o all'ambiente. La scala di Glogau è stata scelta per classificare l'invecchiamento cutaneo: lieve (I), moderato (II), avanzato (III) e grave (IV).
• VISCODERM® SKINKO E mantiene la qualità della pelle per un breve periodo (rimpiombo delle rughe fini, mantenimento dell'idratazione e della luminosità) di tipo I e di Glogau.
• VISCODERM® SKINKO E migliora la qualità della pelle per un breve periodo (rimpiombo delle rughe fini e attenuazione di quelle marcate, ripristino dell'idratazione e della luminosità, mantenimento della luminosità) di tipo I e IV di Glogau.

INCOMPATIBILITÀ
L'assenza di incompatibilità nota tra l'Acido Ialuronico e i sali di Ammonio quarternario come il Cloruro di Benzalconio. Sarà quindi opportuno non mettere mai VISCODERM® SKINKO E a VISCODERM® SKINKO E a contatto con tali prodotti, né con materiale medico-chirurgico trattato con questo tipo di prodotto.

Ed. W1/11.8



FORM AND PRESENTATION
Transparent, colourless, sterile solution which is obtained by aseptic processing, is pyrogen-free, injectable, for single use, presented in cases containing 10 x 5 ml vials. Each case contains one instructions for use and 20 traceability labels.

COMPOSITION
VISCODERM® SKINKO E: Hyaluronic acid* 2 mg + Antiaging complex** q.s.p 5 ml
VISCODERM® SKINKO E: Hyaluronic acid* 32 mg + Antiaging complex** q.s.p 5 ml

*Non-reticulated hyaluronic acid, of biotechnological origin.
**Antiaging complex (buffered preservation media) containing: Water for injection, Ammonium Molybdate, Ammonium Metavanadate, Calcium Chloride, Iron Sulfate, Potassium Chloride, Copper Sulfate, Magnesium Chloride, Manganese Sulfate, Sodium Acetate, Sodium Hydrogen Carbonate, Sodium Chloride, Sodium Hydrogen Phosphate, Sodium Metasilicate, Sodium Selenite, Tin Chloride, Zinc Sulfate, Alanine, Arginine, Asparagine, Aspartic Acid, Cysteine, Glutamine, Glutamic Acid, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine, Adenine, Biotin, Calcium Pantothenate, Coline Chloride, Folic Acid, Inositol, Nicotinamide, Pyridoxine, Riboflavin, Thiamine, Cyanocobalamin, Deoxythymidine, Glucose, Puteosine, Sodium Pyruvate, Lipic Acid. None of the components are of animal and/or human origin.

INTENDED USE
Extracellular matrix replacement material made of hyaluronic acid. It is a resorbable implant intended to be injected by micro-injections techniques into the superficial and medium dermis to fill loss of extracellular matrix and to hydrate the skin due to ageing effects.

INDICATIONS
Devices of the VISCODERM® SKINKO E and VISCODERM® SKINKO E are indicated for the superficial and medium dermis of face including peri-orbital, peribuccal, nasolabial folds and marionette lines. Devices VISCODERM® SKINKO E and VISCODERM® SKINKO E are indicated to reduce effectively ageing effects linked to age, life style or environment. The Glogau scale has been selected to classify the ageing skin as mild (I), moderate (II), advance (III) and severe (IV).

• VISCODERM® SKINKO E maintains the skin quality for a short duration (filling fine lines, maintaining hydration and radiance) of mid skin type (Glogau I).
• VISCODERM® SKINKO E improves skin quality for a short duration (filling fine lines, attenuating marked wrinkles, restoration of hydration and radiance, maintaining keratinisation) of advanced and severe skin type (Glogau III and IV).

CONTRAINDICATIONS
Must not be used with known hypersensitivity or allergy to any of the components

- patients with a skin disease or alteration of any type whatsoever.
- patients with a history of auto-immune diseases or receiving immunotherapy.
- pregnant or breastfeeding women.
- people under the age of 18.

CONTRAINDICAZIONI

- Non deve essere utilizzato:
- nei pazienti che presentano un'ipersensibilità o un'allergia nota ad uno dei componenti,
- nei pazienti che presentano una qualsiasi malattia o alterazione cutanea,
- nei pazienti con malattie autoimmuni pregresse o in corso di immunoterapia,
- nelle donne incinte o in allattamento,
- nelle persone con meno di 18 anni.

PRECAUZIONI PER L'USO

- Non iniettare nelle palpebre, nelle labella, nelle occhiaie e nelle labbra.
- Non iniettare nei tendini, legamenti, ossa, muscoli e vasi sanguigni. Si eviti anche l'anatomia dei vasi sanguigni vena da un paziente all'altro.
- Si raccomanda vivamente di ottenere il preventivo consenso informato del paziente.
- Applicare esclusivamente su una pelle sana.
- Non sono disponibili dati clinici in termini di tolleranza per quanto riguarda l'iniezione di VISCODERM® SKINKO E a VISCODERM® SKINKO E in un'area che è stata trattata con un altro prodotto (a scopo estetico o non) permanente o non, o con un'altra tecnica di medicina estetica. Si raccomanda di non iniettare in un sito che sia già stato trattato con un impianto a lunga durata o permanente.
- Non sono disponibili dati clinici in termini di efficacia e di tolleranza per quanto riguarda l'iniezione di VISCODERM® SKINKO E a VISCODERM® SKINKO E nei pazienti che presentano una storia di precedenti allergie gravi multiple o di shock anafilattico. Il medico dovrà allora decidere sull'indicazione caso per caso in funzione della storia dell'anamnesi e della tolleranza del sito da trattare.
- In caso di reazioni allergiche, il medico deve informare il paziente sulle indicazioni del dispositivo, delle sue controindicazioni, incompatibilità ed effetti indesiderati potenziali.
- Il protocollo prevede 3 sessioni d'iniezioni del contenuto di un fiascuncio al massimo ogni 3 settimane, nel derma superficiale o medio del viso. Per mantenere il risultato, saranno necessarie altre sedute. Sono raccomandate le tecniche nappage, punto per punto e retrotranslazionale.
- Viscoderm® Skinko e Viscoderm® Skinko E devono essere iniettati in modo asettico, con materiale sterile e mono-uso non fornito da ematoni sono maggiori.
- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

INCOMPATIBILITÀ
L'assenza di incompatibilità nota tra l'Acido Ialuronico e i sali di Ammonio quarternario come il Cloruro di Benzalconio. Sarà quindi opportuno non mettere mai VISCODERM® SKINKO E a VISCODERM® SKINKO E a contatto con tali prodotti, né con materiale medico-chirurgico trattato con questo tipo di prodotto.


INCOMPATIBILITÀ
L'assenza di incompatibilità nota tra l'Acido Ialuronico e i sali di Ammonio quarternario come il Cloruro di Benzalconio. Sarà quindi opportuno non mettere mai VISCODERM® SKINKO E a VISCODERM® SKINKO E a contatto con tali prodotti, né con materiale medico-chirurgico trattato con questo tipo di prodotto.

AVVERTENZE
• Prima dell'uso:
- verificare la data di scadenza sull'etichetta dei fiasconi,
- verificare l'integrità dei fiasconi,
- controllare che la soluzione sia trasparente.

• Utilizzare a temperatura ambiente.

• Attenzione: l'esterno dei fiasconi non è sterile.

• Fiasconi monouso: non riutilizzare - non sterilizzare.



FORM AND PRESENTATION
Transparent, colourless, sterile solution which is obtained by aseptic processing, is pyrogen-free, injectable, for single use, presented in cases containing 10 x 5 ml vials. Each case contains one instructions for use and 20 traceability labels.

COMPOSITION
VISCODERM® SKINKO E: Hyaluronic acid* 2 mg + Antiaging complex** q.s.p 5 ml
VISCODERM® SKINKO E: Hyaluronic acid* 32 mg + Antiaging complex** q.s.p 5 ml

*Non-reticulated hyaluronic acid, of biotechnological origin.
**Antiaging complex (buffered preservation media) containing: Water for injection, Ammonium Molybdate, Ammonium Metavanadate, Calcium Chloride, Iron Sulfate, Potassium Chloride, Copper Sulfate, Magnesium Chloride, Manganese Sulfate, Sodium Acetate, Sodium Hydrogen Carbonate, Sodium Chloride, Sodium Hydrogen Phosphate, Sodium Metasilicate, Sodium Selenite, Tin Chloride, Zinc Sulfate, Alanine, Arginine, Asparagine, Aspartic Acid, Cysteine, Glutamine, Glutamic Acid, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine, Adenine, Biotin, Calcium Pantothenate, Coline Chloride, Folic Acid, Inositol, Nicotinamide, Pyridoxine, Riboflavin, Thiamine, Cyanocobalamin, Deoxythymidine, Glucose, Puteosine, Sodium Pyruvate, Lipic Acid. None of the components are of animal and/or human origin.

INTENDED USE
Extracellular matrix replacement material made of hyaluronic acid. It is a resorbable implant intended to be injected by micro-injections techniques into the superficial and medium dermis to fill loss of extracellular matrix and to hydrate the skin due to ageing effects.

INDICATIONS
Devices of the VISCODERM® SKINKO E and VISCODERM® SKINKO E are indicated for the superficial and medium dermis of face including peri-orbital, peribuccal, nasolabial folds and marionette lines. Devices VISCODERM® SKINKO E and VISCODERM® SKINKO E are indicated to reduce effectively ageing effects linked to age, life style or environment. The Glogau scale has been selected to classify the ageing skin as mild (I), moderate (II), advance (III) and severe (IV).

• VISCODERM® SKINKO E maintains the skin quality for a short duration (filling fine lines, maintaining hydration and radiance) of mid skin type (Glogau I).
• VISCODERM® SKINKO E improves skin quality for a short duration (filling fine lines, attenuating marked wrinkles, restoration of hydration and radiance, maintaining keratinisation) of advanced and severe skin type (Glogau III and IV).

CONTRAINDICATIONS
Must not be used with known hypersensitivity or allergy to any of the components

- patients with a skin disease or alteration of any type whatsoever.
- patients with a history of auto-immune diseases or receiving immunotherapy.
- pregnant or breastfeeding women.
- people under the age of 18.

EFFETTI INDESIDERATI
Il medico deve informare il paziente che esistono degli effetti indesiderati potenziali connessi all'iniezione di questo dispositivo, che possono verificarsi immediatamente o in un tempo successivo.
- Effetti indesiderati osservati con VISCODERM® SKINKO E o VISCODERM® SKINKO E:
- dolore e sanguinamento al momento dell'iniezione;
- formicolio, arrossamenti, infiammazione, eritemi e prurito dopo l'iniezione;
- ecchimosi, edema, noduli e gonfiore nel sito d'iniezione.
Infezione dovuta ad una cattiva asepsi.

Scarsa efficacia
Il paziente deve informare il medico nel più breve tempo possibile di qualsiasi altro effetto indesiderato che dovesse persistere per più di una settimana. Il medico dovrà mettere in atto un trattamento adeguato.
Qualsiasi altro effetto indesiderato connesso all'iniezione di VISCODERM® SKINKO E o VISCODERM® SKINKO E deve essere segnalato al distributore ed/o al fabbricante.

Tra gli altri effetti indesiderati riportati in letteratura riguardante gli acidi ialuronici reticolati o non, è opportuno tener conto dei seguenti rischi potenziali:
- eritema di piccola dimensione e reazione allergica;
- perdita di sensibilità temporanea a livello dell'area d'iniezione, colorazione o decolorazione a livello dell'area d'iniezione, nonché dei casi di necrosi nella regione glabellare, d'ascesso, di granuloma, d'ipersensibilità e di papule acneiche.

MODO D'USO

• VISCODERM® SKINKO E e VISCODERM® SKINKO E sono destinati ad essere iniettati da un medico con esperienza della pratica dell'anatomia e dovrà assicurare una partita sovrappiù.
• Prima dell'iniezione, il medico deve informare il paziente sulle indicazioni del dispositivo, delle sue controindicazioni, incompatibilità ed effetti indesiderati potenziali.
• Il protocollo prevede 3 sessioni d'iniezioni del contenuto di un fiascuncio al massimo ogni 3 settimane, nel derma superficiale o medio del viso. Per mantenere il risultato, saranno necessarie altre sedute. Sono raccomandate le tecniche nappage, punto per punto e retrotranslazionale.

• Viscoderm® Skinko e Viscoderm® Skinko E devono essere iniettati in modo asettico, con materiale sterile e mono-uso non fornito da ematoni sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.- Evitare l'assunzione di anti-infiammatori, di antiaggreganti piastrinici, di aspirina e di anticoagulanti (farmaci o non) prima dell'iniezione.
- Raccomandare al paziente, 48 ore prima dell'iniezione e nelle due settimane successive, di evitare l'esposizione prolungata al sole, agli UV, al freddo intenso, come pure la sauna o il bagno turco e di astenersi da qualsiasi altro trattamento di medicina estetica.
- Si raccomanda di non applicare alcun prodotto per il prelievo e l'iniezione.
- Non iniettare troppo velocemente.
- La quantità da iniettare è in funzione dell'area da trattare. Non superare la quantità di un fiascuncio - ossia 5 ml di soluzione - per seduta.

• In caso di disturbi dell'emostasi o di terapia anticoagulante, i rischi di ematomi sono maggiori.-

